


夏天狗猫易发毛 防火防盗防狗咬

天气一热,不但人觉得烦躁,连平时一向温顺的宠物也是脾气见长,各种猫狗伤人意外屡屡发生。记者了解到,每年4月到10月是狂犬疫苗接种的高峰期。据省立医院感染病院区动物咬伤科潘子平医生介绍,该科平均一天接诊接种狂犬疫苗患者300至400人,最多时一天有800例左右。除了猫猫狗狗外,老鼠、兔子、蝙蝠等都可能成为攻击人的“凶手”。潘子平提醒,一旦被哺乳动物咬伤或抓伤,要及时接种狂犬疫苗。

高概 刁联硕 记者 李皖婷



TIP1: 咬伤后第一时间清洗

被狗猫咬伤后,立即用清水、肥皂水、去污剂彻底冲洗伤口,再用乙醇或碘酊涂擦伤口,人用狂犬病免疫球蛋白或抗狂犬病血清做伤口周围浸润注射。

要尽量避免缝合伤口,如必须缝合,则应保证免疫球蛋白已按上述要求在伤口周围浸润注射。需要应用抗生素或抗破伤风措施时,应在局部处理后再进行。



TIP2: 注射人用狂犬病免疫球蛋白或血清

头面部及会阴部咬伤,一处或多处皮肤被穿透性咬伤、被抓伤出血、唾液污染伤口、破损的皮肤被舔,应予注射。

疫苗作用缓慢,暴露后的0-42天,最短14天,人体缺乏免疫保护。免疫球蛋白或血清可快速中和伤口周围的病毒,阻断病毒向神经组织移动。降低体内病毒浓度,延长潜伏期,给疫苗发挥作用提供条件。

TIP3: 注射人用 狂犬病疫苗

一般咬伤者于0天(第一天,当天)、3天(第四天,以下类推)、7天、14天、28天各注射本疫苗1剂,共5针,儿童用量相同。成人必须于上臂三角肌内注射,儿童于大腿前外侧区肌内注射,禁止臀部注射。

注射疫苗后一般无不良反应,少数人有发热。过敏性皮疹,注射部位红肿、疼痛感,一般无需特殊处理,可自行恢复。

潘子平表示,对有下列情形之一的,建议首剂狂犬病疫苗剂量加倍:

- ◎ 注射疫苗前1个月内注射过免疫球蛋白或抗血清者;
- ◎ 先天性或获得性免疫缺陷病人;
- ◎ 接受免疫抑制剂(包括抗癌药物)治疗的病人;
- ◎ 老年人及患慢性病者;
- ◎ 于暴露后48小时或更长时间后才注射狂犬病疫苗的人员。



结伴养老:温暖中也有隐忧

未登记领证只算同居,出现纠纷不按夫妻关系处理

02版

善良老太打零工 将弃婴培养成才

03版

孩子睡得好 有利于长得高

04版

冬病夏治 不只是贴三伏贴

05版